

SCAN 2000

Der unabhängige Antikörper-Check für Geimpfte und Ungeimpfte

Viele Menschen spüren seit der Pandemie Veränderungen in ihrer Gesundheit: Müdigkeit, Brainfog, Infektanfälligkeit, Entzündungen. Doch woher kommen diese Symptome? Wie stark reagiert Ihr Immunsystem noch auf das Spike-Protein - Monate oder Jahre nach einer Impfung? Und können auch Ungeimpfte betroffen sein?

Das Projekt SCAN 2000 will Antworten liefern.

In einem unabhängigen Rahmen - **ohne pharmazeutische Interessen** - wird Ihr **IgG-Antikörperspiegel gegen das Spike-Protein gemessen**. Das Ziel: ein realistisches Bild der Immunitätslage in der Bevölkerung der DACH-Region zu erfassen - bei Geimpften, Ungeimpften und Menschen mit Shedding-Symptomen.

Schon Werte über 400 BAU können auf eine anhaltende Spike-Belastung hinweisen. Ab 1000 BAU steigt das Risiko für chronische Entzündungen, Spikopathien, Herz-Kreislauf-Probleme und mehr. Doch mit der richtigen Begleitung kann der Körper unterstützt werden - z. B. durch gezielte Entgiftung, Stoffwechselaktivierung und naturheilkundliche Ansätze wie **Methylenblau, CDL, Zeolit oder Mikronährstoffe**.

SCAN 2000 verbindet medizinisch fundierte Analyse mit naturheilkundlicher Praxis.

Holen Sie sich Klarheit: Wie stark sind Sie noch belastet? Was sagt Ihr IgG-Spiegel? Und welche nächsten Schritte sind sinnvoll?

Jetzt Termin vereinbaren bei **Sandra Späni**: +41 55 610 28 48

Oder direkt per E-Mail: **sandrakrieg@bluewin.ch**

Projekt SCAN 2000 - Messung des IgG Antikörper Spiegels Corona - Immunitätscheck

Ziel

- Abschätzung des prozentualen Anteils potentieller Impfschäden in der Bevölkerung in der DACH Region
- Messung an « Normalen» Menschen unabhängig von der Pharmaindustrie
- Selbstfinanziert und unabhängig

Argumente zum Testen

- hat die Impfung gewirkt?
- Wie lange sind Antikörper auf Spikeproteine im Blut?
- Haben Ungeimpfte auch Spikes AK im Blut?

IgG Spiegel

- Nach spätestens 1Jahr sollten keine hohe AK Titer bei Geimpften mehr im Blut sein
- BAU: (binding Anitbody Unit)
- Ab 40 - 384 BAU - Ausreichende Immunität
- Ab 400 - 1000 BAU Spikopathie oder Shedding

Kontrollmessung in 6Monaten

- Ab 1001 - 2000 BAU schwere SarsCov-2 Infektion oder verbleibende Produktion von Spikes im Körper

Kontrollmessung in 4-6 Wochen

- Gefahr von Thrombosen und Herzschäden
- Spikopathie und chronische Entzündung vorhanden

Ungeimpft

- Normalwerten zwischen 50 - 400 BAU
- **Sheddingopfer** haben meist stark erhöhte, teilweise über 3000 BAU
- Erste Sheddingsymptome ab 700 BAU

Symptome von Shedding

- Niesen, Übelkeit, Durchfall, Husten, Veränderungen im Blutbild, Ausschläge, Rückenschmerzen, Infekte, Brainfog, Schweissausbrüche ect.

Was ist Shedding

- Die Modifizierte RNA wurde technisch in Nano-Lipidpartikel verpackt - damit sie überhaupt durch die fetthaltige Zellmembran in die Zelle gelangen kann.
- Dort veranlasst die RNA die Zellen Spike Proteine zu bilden.
- Diese Spike Proteine (Eiweisskörper) werden dann dem Körper präsentiert und dieser bildet darauf Antikörper.
- Die Modifizierte RNA wird in der Leber entsorgt und die Lipidhülle wird entfernt - die Leber macht eine körpereigene Hülle darum.
- Die nun entstandenen Partikel heissen Exosomen.
- Die Exosomen werden von geimpften Menschen ausgeschieden (über Schweiss, Atem, Speichel, Körperflüssigkeit)
- Wenn jemand, Ungeimpft, die Exosomen einatmet, ist er relativ schnell krank (innerhalb 1-3 Tage) es entsteht eine «Pseudoallergie»

CARPA Reaktion

- Es handelt sich um Komplement aktivierte Pseudoallergien
- Nicht vorhersehbar
- Nicht testbar
- Können schnell und langsam eintreten
- 5-45% der Menschen reagieren mit einer Carpra Reaktion auf «Nanopartikel»
- 2% der Menschen auf Penicillin (ähnliche Reaktion)
- Bei dieser Carpra Reaktion bildet der Körper auch IgG AK!!
- Reduktion des AK- Spiegel meist nach ca. 1Monat wenn keine weitere Exposition zu Ausscheidenden stattgefunden hat
- 50% der Geimpften scheiden nach 2Jahren noch Spikes oder Exosomen aus.
- Es kommt zu Schäden in den Blutgefässen, am Herzen,
- Bindung der Spikes an ACE-2Rezeptoren (diese befinden sich in Fettgewebe, Nieren, Herz) macht dort Entzündungen.
- Mitochondriopathie entsteht (die Kraftwerke der Zellen und Körpers können nicht mehr arbeiten. Es entsteht ein Energiemangel auf allen Ebenen).
- Die Lipidnanopartikel können auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dadurch ist eine Spikeproduktion im Gehirn möglich = chronische Entzündung - Untergang von

Hirngewebe = Barin Fog etc.

Behandlungsmöglichkeiten

Methylenblau

- antientzündlich, antifungal (Pilze)
- Antibiotische Eigenschaften
- Überbrückt die kaputten Stellen in den Mitochondrien wie ein Überbrückungskabel und dadurch kann die Energie wieder fließen
- Greift positiv in den Hirnstoffwechsel ein
- Das Molekül geht immer zuerst dorthin, wo es gebraucht wird (daher kann die Wirkung verspätet eintreten)

Dosis:

- 2 x 3 -12 Tropfen pro Tag (bis 50mg/Tag 1%ige Lösung: 10mg = 20Trpf)
- kann mit Kaffee, Tee, O-Saft getrunken werden

CDL (Chlordioxid)

- in Wasser gelöstes Gas aus einer Reaktion von (Natriumchlorit und 4%iger Salzsäure)
- gelbe Flüssigkeit
- wird immer verdünnt (innerlich) angewendet
- muss kühl und dunkel gelagert werden
- führt zu einer Sauerstofffreisetzung im Blut und Gewebe
- bessere Durchblutung der Gewebe
- wirkt sowohl als Oxidationsmittel als auch als Antioxidationsmittel
- zerstört Toxine und Spikeproteine
- Tötet Viren, Bakterien, Pilze,
- Histamin: welches für viele Entzündungserscheinungen verantwortlich ist, wird oxidiert und in seiner Struktur zerstört und wird dadurch unwirksam.
- Es kann entscheidende Aminosäuren im Spike Protein zerstören
- Es erhöht die Fließfähigkeit des Blutes
- Setzt an vielen Stellen im Körper an

Dosis:

10 ml CDL 0.3%ig auf 1lt Wasser, in dunkle Glasflasche, geben und davon Std. 100ml trinken, 2 Std. Abstand zu Vit.C

- Bitte langsam anfangen, am besten 1ml auf 1 lt. Wasser, da es zu starken
- Entgiftungsreaktionen kommen kann. Dosis nach und nach anpassen.
- Mindestens 6Wochen - 6Monate einnehmen

NEBENWIRKUNG: eine allgemeine Verbesserung des Gesundheitszustandes auf allen Ebenen!!

Zeolit

- Vulkangestein / Mineral
- Zur Entgiftung / Bindemittel für Stoffwechselabfall-Produkte
- *Bei CDL* immer Zeolit mitbenutzen
- Schwermetalle gebunden werden
- Ausscheidung über den Stuhlgang = reinigend
- Ideale Einnahme: abend's 1TL Zeolit mit einem Glas warmem Wasser, damit können über die Nacht die Giftstoff / Pathogenekeime gebunden und ausgeschieden werden

Nikotin (Dr. Brayn artis?)

- Das Gegenmittel / Heilmittel
- In allen Nachtschattengewächsen vorhanden
- Die menschliche Zellen haben Rezeptoren dafür, d.h. die Menschen können dies aus den Pflanzen aufnehmen
- Das Nikotin-Pflaster / Kaugummi reinigt die Zellen von den Corona Proteinen und können danach das Nikotin aus der Ernährung wieder aufnehmen
- 2mg morgens und Nachmittags (17.00Uhr) einen Kaugummi
- Nikotinell-Kaugummi und Pflaster machen nicht süchtig

Dosierung:

- 14mg Pflaster: 4 während 24Std. auf der Haut belassen

Allgemeine Massnahmen

- Entsäuern: Mineral-Basenpulver, Natron, Basenbäder

- Giftbindend: Heilerde, Spirulina, Chlorella, Zeolit
- Omega 3 Fettsäuren hochdosiert
- Mikronährstoffe: am besten bei Heilpraktiker oder kundigem Arzt vorher bestimmen lassen z.B. Haarmineral-Analyse
- Probiotische Bakterien zum Aufbau der Darmflora
- Nattokinase: mind. 2000IU tgl.
- Artemisia annua
- Bromelain
- Kurkumin
- Taraxacum CERES
- Ketogene Diät
- Aufenthalt in geschlossenen Räumen, mit vielen Menschen meiden
- Sauna: 1-3 x wöchentlich max. 70 Grad
- Erhöhung der Sauerstoffzufuhr: Bewegung an der frischen Luft , IHHT-TherapieDie Möglichkeiten werden laufend verändert / verbessert / ergänzt



Kontakt & weitere Informationen

Sandra Späni, Seidenstrasse 33, CH- 8868 Oberurnen

sandrakrieg@bluewin.ch Tel.: +41 55 610 28 48

Bei telefonischer-Beratung werden pro 15 Min. CHF 23.- in Rechnung gestellt

[PDF erstellen](#)