

SCAN 2000

Der unabhängige Antikörper-Check für Geimpfte und Ungeimpfte

Viele Menschen spüren seit der Pandemie Veränderungen in ihrer Gesundheit: Müdigkeit, Brainfog, Infektanfälligkeit, Entzündungen. Doch woher kommen diese Symptome? Wie stark reagiert Ihr Immunsystem noch auf das Spike-Protein – Monate oder Jahre nach einer Impfung? Und können auch Ungeimpfte betroffen sein?

Das Projekt SCAN 2000 will Antworten liefern.

In einem unabhängigen Rahmen – **ohne pharmazeutische Interessen** – wird Ihr **IgG-Antikörperspiegel gegen das Spike-Protein gemessen**. Das Ziel: ein realistisches Bild der Immunitätslage in der Bevölkerung der DACH-Region zu erfassen – bei Geimpften, Ungeimpften und Menschen mit Shedding-Symptomen.

Schon Werte über 400 BAU können auf eine anhaltende Spike-Belastung hinweisen. Ab 1000 BAU steigt das Risiko für chronische Entzündungen, Spikopathien, Herz-Kreislauf-Probleme und mehr. Doch mit der richtigen Begleitung kann der Körper unterstützt werden – z. B. durch gezielte Entgiftung, Stoffwechselaktivierung und naturheilkundliche Ansätze wie **Methylenblau, CDL, Zeolit oder Mikronährstoffe**.

SCAN 2000 verbindet medizinisch fundierte Analyse mit naturheilkundlicher Praxis.

☐ *Holen Sie sich Klarheit: Wie stark sind Sie noch belastet? Was sagt Ihr IgG-Spiegel? Und welche nächsten Schritte sind sinnvoll?*

☐ Jetzt Termin vereinbaren bei **Sandra Späni**: +41 55 610 28 48

☐ Oder direkt per E-Mail: **sandrakrieg@bluewin.ch**

Projekt SCAN 2000 - Messung des IgG Antikörper Spiegels Corona - Immunitätscheck

Ziel

- Abschätzung des prozentualen Anteils potentieller Impfschäden in der Bevölkerung in der DACH Region
- Messung an « Normalen» Menschen unabhängig von der Pharmaindustrie
- Selbstfinanziert und unabhängig

Argumente zum Testen

- hat die Impfung gewirkt?
- Wie lange sind Antikörper auf Spikeproteine im Blut?
- Haben Ungeimpfte auch Spikes AK im Blut?

IgG Spiegel

- Nach spätestens 1Jahr sollten keine hohe AK Titer bei Geimpften mehr im Blut sein
- BAU: (binding Anitbody Unit)
- Ab 40 - 384 BAU - Ausreichende Immunität
- Ab 400 - 1000 BAU Spikopathie oder Shedding

Kontrollmessung in 6Monaten

- Ab 1001 - 2000 BAU schwere SarsCov-2 Infektion oder verbleibende Produktion von Spikes im Körper

Kontrollmessung in 4-6 Wochen

- Gefahr von Thrombosen und Herzschäden
- Spikopathie und chronische Entzündung vorhanden

Ungeimpft

- Normalwerten zwischen 50 - 400 BAU
- **Sheddingopfer** haben meist strak erhöhte, teilweise über 3000 BAU
- Erste Sheddingsymptome ab 700 BAU

Symptome von Shedding

- Niesen, Übelkeit, Durchfall, Husten, Veränderungen im Blutbild, Ausschläge, Rückenschmerzen, Infekte, Brainfog, Schweissausbrüche ect.

Was ist Shedding

- Die Modifizierte RNA wurde technisch in Nano-Lipidpartikel verpackt – damit sie überhaupt durch die fetthaltige Zellmembran in die Zelle gelangen kann.
- Dort veranlasst die RNA die Zellen Spike Proteine zu bilden.
- Diese Spike Proteine (Eiweisskörper) werden dann dem Körper präsentiert und dieser bildet darauf Antikörper.
- Die Modifizierte RNA wird in der Leber entsorgt und die Lipidhülle wird entfernt – die Leber macht eine körpereigene Hülle darum.
- Die nun entstandenen Partikel heissen Exosomen.
- Die Exosomen werden von geimpften Menschen ausgeschieden (über Schweiss, Atem, Speichel, Körperflüssigkeit)
- Wenn jemand, Ungeimpft, die Exosomen einatmet, ist er relativ schnell krank (innerhalb 1-3 Tage) es entsteht eine «Pseudoallergie»

CARPA Reaktion

- Es handelt sich um Komplement aktivierte Pseudoallergien
- Nicht vorhersehbar
- Nicht testbar
- Können schnell und langsam eintreten
- 5-45% der Menschen reagieren mit einer Carpra Reaktion auf «Nanopartikel»
- 2% der Menschen auf Penicillin (ähnliche Reaktion)
- Bei dieser Carpra Reaktion bildet der Körper auch IgG AK!!
- Reduktion des AK- Spiegel meist nach ca. 1Monat wenn keine weitere Exposition zu Ausscheidenden stattgefunden hat
- 50% der Geimpften scheiden nach 2Jahren noch Spikes oder Exosomen aus.
- Es kommt zu Schäden in den Blutgefässen, am Herzen,
- Bindung der Spikes an ACE-2Rezeptoren (diese befinden sich in Fettgewebe, Nieren, Herz) macht dort Entzündungen.
- Mitochondriopathie entsteht (die Kraftwerke der Zellen und Körpers können nicht mehr arbeiten. Es entsteht ein Energiemangel auf allen Ebenen).
- Die Lipidnanopartikel können auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dadurch ist eine Spikeproduktion im Gehirn möglich = chronische Entzündung – Untergang von

Hirngewebe = Barin Fog etc.

Individuelle Behandlungsmöglichkeiten werden bei der Testung aufgezeigt.



Kontakt & weitere Informationen

Sandra Späni, Seidenstrasse 33, CH- 8868 Oberurnen

sandrakrieg@bluewin.ch Tel.: +41 55 610 28 48

Bei telefonischer-Beratung werden pro 15 Min. CHF 23.- in Rechnung gestellt

PDF ausdrucken und verteilen:

[PDF erstellen](#)